Согласовано
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

07.02.2023

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Празицид®-суспензия НЕО

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.23-4961№ПВР-3-2.23/03789

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Празицид®-суспензия НЕО (Prazicid-suspension NEO);

международные непатентованные наименования действующих веществ: фебантел, пирантела памоат, празиквантел.

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Празицид®-суспензия НЕО в качестве действующих веществ содержит фебантел, пирантела памоат и празиквантел. Выпускают лекарственный препарат в трех модификациях: Празицид®-суспензия НЕО для котят и взрослых кошек с содержанием в 1 мл: 15 мг фебантела, 15 мг пирантела памоата и 5 мг празиквантела; Празицид®-суспензия НЕО для щенков и взрослых собак мелких пород с содержанием в 1 мл: 15 мг фебантела, 15 мг пирантела памоата и 5 мг празиквантела; Празицид®-суспензия НЕО для щенков и взрослых собак средних и крупных пород с содержанием в 1 мл: 45 мг фебантела, 45 мг пирантела памоата и 15 мг празиквантела.

В качестве вспомогательных веществ препарат содержит: глицерин, ионообменную смолу, кремния диоксид коллоидный, ароматизатор ванильно-сливочный, ксантановую камедь повышенной эффективности F, калия сорбат, натрия бензоат, сукралозу, полидиметилсилоксан и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от светло-желтого до желтого цвета, при хранении допускается расслоение, исчезающее при взбалтывании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона – 60 суток.

Запрещается применение Празицид®-суспензии НЕО по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 10 мл во флаконы из коричневого стекла, укупоренные пластиковыми адаптерами для шприца-дозатора и навинчиваемыми полимерными крышками с уплотнительной прокладкой из полимерных материалов с контролем первого вскрытия, или во флаконы из полимерного материала, укупоренные пластиковыми адаптерами для шприца-дозатора и навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы упаковывают поштучно в картонную пачку в комплекте с инструкцией по применению, наклейками в ветеринарный паспорт и шприцем-дозатором из полимерного материала.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Празицид®-суспензию НЕО следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Празицид®-суспензия НЕО относится к антигельминтным лекарственным средствам в комбинациях.

10. Комбинация фебантела, пирантела памоата и празиквантела, входящих в состав препарата Празицид®-суспензия НЕО, обеспечивает широкий спектр его антигельминтного действия на желудочно-кишечных нематод (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum) и цестод (Echinococcus granulosus, Taenia solium, Echinococcus multilocularis, Mesocestoides lineatus, Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum, Multiceps multiceps), паразитирующих у собак и кошек. Фебантел действует в отношении нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также простейших Giardia spp.

Пирантела памоат – соединение группы пиримидинов, механизм его действия основан на блокаде передачи нервных импульсов в нервно-мышечных синапсах путем деполяризации мембран мышечных клеток, что вызывает паралич мышечной системы нематод; пирантел плохо всасывается, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике; выводится из организма в основном в неизмененном виде (93%) с фекалиями.

Фебантел относится к пробензимидазолам, биотрансформирующимся в организме в бензимидазолы. Механизм действия фебантела основан на ингибировании фермента фумаратредуктазы в митохондриях, в результате чего нарушается усвоение глюкозы и синтез белка тубулина, что приводит к разрушению микротубулярного аппарата клеток паразита, вызывая его гибель. Фебантел всасывается в кишечнике, метаболизируется в печени и выделяется с желчью в просвет кишечника, где частично отмечается его повторная резорбция, из организма выводится как в неизмененной форме, так и в виде нескольких метаболитов с фекалиями и мочой.

Празиквантел – соединение группы пиразинизохинолинов, активно в отношении желудочно-кишечных цестод на всех фазах развития. Повышая проницаемость клеточных мембран паразита для ионов кальция (Ca^{2+}), вызывает деполяризацию мембран, сокращение мускулатуры и разрушение тегумента, что приводит к гибели гельминтов и способствует их выведению из организма животного. Соединение быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 1 – 3 часа, обратимо связывается с белками сыворотки крови (70 – 80%), частично метаболизируется в печени, реэкскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80%) в течение 24 часов.

Празицид®-суспензия НЕО по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия, хорошо переносится собаками и кошками разных пород и возрастов.

III. Порядок применения

11. Празицид®-суспензию НЕО назначают котятам и щенкам с 3-недельного возраста, взрослым кошкам и собакам с профилактической и лечебной целью при

желудочно-кишечных нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, трихоцефалез, анкилостомоз), цестодозах (тениидоз, дипилидиоз, альвеококкоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз), ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях и лямблиозе.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Празицид®-суспензию НЕО не следует применять истощенным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, щенкам и котятам моложе 3-недельного возраста.

13. При работе с Празицид®-суспензией НЕО следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Празицид®-суспензией НЕО. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Празицид®-суспензию НЕО не следует назначать беременным самкам в первые две трети периода беременности, щенкам и котятам моложе 3-недельного возраста. Самкам в период вскармливания приплода, при необходимости, препарат применяют под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

15. Лекарственный препарат применяют животным перорально индивидуально, в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно на корень языка с помощью шприца-дозатора в следующих дозах:

Празицид®-суспензия НЕО для котят и взрослых кошек – 1 мл на 1 кг массы животного;

Празицид®-суспензия НЕО для щенков и взрослых собак мелких пород – 1 мл на 1 кг массы животного;

Празицид®-суспензия НЕО для щенков и взрослых собак средних и крупных пород – 1 мл на 3 кг массы животного.

С профилактической целью дегельминтизацию животных проводят однократно один раз в квартал, а также перед каждой вакцинацией.

С лечебной целью и с целью профилактики при групповом (скученном) содержании животных (в питомниках, приютах, вивариях) обработку проводят:

- при нематодозах, цестодозах, ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях – двукратно с интервалом 14 суток;
- при лямблиозе – один раз в день в течение 3 последовательных дней.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется. Флакон с суспензией перед каждым применением следует тщательно встряхнуть.

16. При применении Празицид®-суспензии НЕО в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У некоторых животных возможны нарушения работы желудочно-кишечного тракта (жидкий стул, рвота) и усиление слюноотделения, которые исчезают самопроизвольно и не требуют применения лекарственных средств. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его

использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма, назначают энтеросорбенты и средства симптоматической терапии.

18. Празицид®-суспензию НЕО не следует применять одновременно с лекарственными препаратами, содержащими пиперазин, и средствами, ингибирующими холинэстеразу. Информация о несовместимости Празицид®-суспензии НЕО с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене у собак не выявлено. У кошек после первого приема препарата возможна кратковременная самопроходящая гиперсаливация.

20. Следует избегать нарушений схемы дегельминтизации, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дозы, препарат необходимо ввести как можно скорее в той же дозе, далее интервал между введениями препарата не изменяется.

21. Празицид®-суспензия НЕО не предназначена для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО «Апиценна», Московская область, 143985, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ООО «Апиценна», Московская область, 143985, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4. + 7 (495) 580-77-13, www.apicenna.ru, info@apicenna.ru.

Генеральный директор
ООО «АПИ-САН» А.А. Смирнов